

平成30年度

三島ようらん保育園 子育て支援センター

☆ゆりかご☆

開所時間 9:00 ~ 12:00




2月の予定



- ★ 1日(金) ー 園行事の為 お休み
- ★ 4日(月) ☆ 自由遊び
- ★ 5日(火) ☆ 自由遊び
- ★ 8日(金) ☆ 自由遊び・身体測定
- ★ 11日(月) ー 建国記念日の為 お休み
- ★ 12日(火) ー 園行事の為 お休み
- ★ 15日(金) ☆ 自由遊び
- ★ 18日(月) ☆ 自由遊び
- ★ 19日(火) ☆ 自由遊び
- ★ 22日(金) ☆ 自由遊び
- ★ 25日(月) ☆ 自由遊び・おひなさまを作ろう
- ★ 26日(火) ☆ 自由遊び

お知らせ

☆今月は、1日(金)、11日(月)、
12日(火)がお休みとなっております。
お間違えのないようお願い致します。



子どものおう吐・下痢

突然のおう吐・下痢の原因として多いのは、ノロウイルスやロタウイルスに代表されるウイルス性胃腸炎です。これらに感染している場合、吐物や排泄物にウイルスが含まれているので感染拡大防止の為にも適切な処理が必要です。ウイルスは吐物や排泄物の周囲2mの範囲に飛んでいます。室内の換気をし、マスクや手袋をして処理にあたりましょう。汚物を拭いた紙や雑巾は、ビニール袋に入れてしっかり口をしめて処分。汚物のついた床やおもちゃは、次亜塩素酸ナトリウム(塩素系漂白剤…ハイターやブリーチなど)をうすめたもので消毒します。(1ℓの水に4~20cc、濃度0.02~0.1% 空のペットボトルなどで作ると良い)アルコール消毒では効果はありません。感染後1~2週間は便中にウイルスが排泄されます。その後の排便処理時も、手洗いの徹底を心がけましょう。

おう吐した子どもは、口を軽くゆすいで安静に。脱水が心配でもすぐに何か飲ませると、またおう吐を誘発させてしまう為しばらく様子を見てから経口イオン飲料を少量ずつ与えましょう。下痢の時の食事は、肉類・油分の多いもの・繊維質・イチゴ・みかん等避け、温かく消化の良いものを食べられる分だけ。下痢でおしりが赤い場合は、こすらずぬるま湯で流してあげましょう。

- ★ ご利用の際は、2F子育て支援センター内にて「受付」を済ませてからご利用下さい。
- ★ 予定は、三島ようらん保育園ホームページでも、確認することができます。

